



ΑΥΓΕΣΗΣΗ

ΑΝΟΙΞΗΣΗ

### ΒΛΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

**Έναρξη / ρίζωμα φυτών** - (3 - 5 ημέρες)  
Βρέστε το υπόστρωμα

Περίοδος καλλιέργειας σε εβδομάδες	Φως ανά ημέρα σε ώρες	Hydro Vega ml A/ 10 λίτρα ml B/ 10 λίτρα	Hydro Flores ml A/ 10 λίτρα ml B/ 10 λίτρα	RHIZOTONIC ml/ 10 λίτρα	CANNAZYM ml/ 10 λίτρα	CANNABOOST ml/ 10 λίτρα	PK 13/14 ml/ 10 λίτρα	EC + σε mS/cm	Συνολική EC σε mS/cm
<1	18	10-20	-	40	-	-	-	0.7-1.1	1.1-1.5
Βλαστική φάση I - Αύξηση φυτών σε όγκο	0-3 <sup>1</sup>	18	15-25	-	20	25	-	0.9-1.3	1.3-1.7

**Βλαστική φάση II** - Έως τη στασιμότητα της αύξησης μετά την καρποφορία ή τον σχηματισμό ανθέων

2-4 <sup>2</sup>	12	20-30	-	20	25	20 <sup>5</sup>	-	1.2-1.6	1.6-2.0
------------------	----	-------	---	----	----	-----------------	---	---------	---------

### ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΦΑΣΗ

**Αναπαραγωγική φάση I** - Αύξηση ανθέων και καρπών σε μήκος. Ολοκλήρωση αύξησης σε ύψος

2-3	12	-	25-35	5	25	20-40	-	1.4-1.8	1.8-2.2
-----	----	---	-------	---	----	-------	---	---------	---------

**Αναπαραγωγική φάση II** - Ανάπτυξη ανθέων ή καρπών σε όγκο (πλάτος)

1	12	-	25-35	5	25	20-40	15	1.5-1.9	1.9-2.3
---	----	---	-------	---	----	-------	----	---------	---------

**Αναπαραγωγική φάση III** - Ανάπτυξη ανθέων ή καρπών σε μάζα (βάρος)

2-3	12	-	15-25	5	25	20-40	-	1.0-1.4	1.4-1.8
-----	----	---	-------	---	----	-------	---	---------	---------

**Αναπαραγωγική φάση IV** - Ωρίμανση ανθέων ή καρπών

1-2	10-12 <sup>3</sup>	-	-	-	25-50 <sup>4</sup>	20-40	-	0.0	0.4
-----	--------------------	---	---	---	--------------------	-------	---	-----	-----

1. Αυτή η περίοδος κυμαίνεται ανάλογα με το είδος και τον αριθμό φυτών ανά m<sup>2</sup>. Τα μητρικά φυτά παραμένουν στη φάση αυτή έως το τέλος (6-12 μήνες).
2. Η μετάβαση από τις 18 στις 12 ώρες κυμαίνεται ανάλογα με την ποικιλία. Εμπειρικά, συνήθως γίνεται μετά από 2 εβδομάδες.
3. Μειώστε τις ώρες φωτός αν η ωρίμανση είναι πολύ γρήγορη. Προσοχή στην αύξηση της σχετικής υγρασίας.
4. Διπλασιάστε τη δόση CANNAZYM σε 50 ml/10 λίτρα αν το υπόστρωμα έχει επαναχρησιμοποιηθεί.
5. Κατά κανόνα, 20 ml/10 λίτρα. Αυξήστε έως το πολύ 40 ml/10 λίτρα για πιο έντονη ανθοφορία.

EC: Η τιμή της EC μετριέται σε mS/cm, όπου EC νερού = 0 στους 25°C, και σε pH 6.0.

Προσθέτε την EC του νερού που χρησιμοποιείτε στη συνιστώμενη EC!  
Η συνολική EC στο παράδειγμα υπολογίστηκε με EC νερού 0.4.

pH: Το συνιστώμενο pH κυμαίνεται μεταξύ 5.2 και 6.2.  
Η προσθήκη pH- μπορεί να αυξήσει την EC.  
Προσθέτετε pH-grow στη βλαστική φάση για μείωση του pH.  
Προσθέτετε pH-bloom στην αναπαραγωγική φάση για μείωση του pH.

Οι οδηγίες του πίνακα δεν χρειάζεται να τηρηθούν αυστηρά, αλλά μπορούν να βοηθήσουν τους αρχάριους καλλιεργητές να αναπτύξουν συστηματική στρατηγική. Η βέλτιστη τακτική λίτισης εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως: Θερμοκρασία, υγρασία, είδος φυτού, όγκος ριζών, ποσόστωση υγρασίας στο υπόστρωμα, στρατηγική ποσιμότητας κ.λπ.

Δημιουργήστε το προσωπικό σας πρόγραμμα καλλιέργειας στο [www.canna-gr.com](http://www.canna-gr.com).

**CANNA**  
The solution for growth and bloom