



Περίοδος καλλιέργειας σε εβδομάδες	Φως ανά ημέρα σε ώρες	Hydro Vega ml A/ 10 λίτρα ml B/ 10 λίτρα	Hydro Flores ml A/ 10 λίτρα ml B/ 10 λίτρα	RHIZOTONIC ml/ 10 λίτρα	CANNAZYM ml/ 10 λίτρα	CANNABOOST ml/ 10 λίτρα	PK 13/14 ml/ 10 λίτρα	EC + σε mS/cm	Συνολική EC σε mS/cm
------------------------------------	-----------------------	--	--	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------------

ΒΛΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

ΑΥΞΗΣΗ

Έναρξη / ριζώμα φυτών - (3-5 ημέρες) Βρέξτε το υπόστρωμα	<1	18	15-25	-	40	-	-	-	0.7-1.1	1.1-1.5
--	----	----	-------	---	----	---	---	---	---------	---------

Βλαστική φάση I - Αύξηση φυτών σε όγκο	0-3 ¹	18	20-30	-	20	25	-	-	0.9-1.3	1.3-1.7
---	------------------	----	-------	---	----	----	---	---	---------	---------

Βλαστική φάση II - Έως τη στασιμότητα της αύξησης μετά την καρποφορία ή τον σχηματισμό ανθέων	2-4 ²	12	25-35	-	20	25	20 ⁵	-	1.2-1.6	1.6-2.0
--	------------------	----	-------	---	----	----	-----------------	---	---------	---------

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΦΑΣΗ

ΑΝΘΙΣΗ

Αναπαραγωγική φάση I - Αύξηση ανθέων και καρπών σε μήκος. Ολοκλήρωση αύξησης σε ύψος	2-3	12	-	25-35	5	25	20-40	-	1.4-1.8	1.8-2.2
---	-----	----	---	-------	---	----	-------	---	---------	---------

Αναπαραγωγική φάση II - Ανάπτυξη ανθέων ή καρπών σε όγκο (πλάτος)	1	12	-	25-35	5	25	20-40	15	1.6-2.0	2.0-2.4
--	---	----	---	-------	---	----	-------	----	---------	---------

Αναπαραγωγική φάση III - Ανάπτυξη ανθέων ή καρπών σε μάζα (βάρος)	2-3	12	-	20-30	5	25	20-40	-	1.1-1.5	1.5-1.9
--	-----	----	---	-------	---	----	-------	---	---------	---------

Αναπαραγωγική φάση IV - Ωρίμανση ανθέων ή καρπών	1-2	10-12 ³	-	-	-	25-50 ⁴	20-40	-	0.0	0.4
---	-----	--------------------	---	---	---	--------------------	-------	---	-----	-----

- Αυτή η περίοδος κυμαίνεται ανάλογα με το είδος και τον αριθμό φυτών ανά m². Τα μητρικά φυτά παραμένουν στη φάση αυτή έως το τέλος (6-12 μήνες).
- Η μετάβαση από τις 18 στις 12 ώρες κυμαίνεται ανάλογα με την ποικιλία. Εμπειρικά, συνήθως γίνεται μετά από 2 εβδομάδες.
- Μειώστε τις ώρες φωτός αν η ωρίμανση είναι πολύ γρήγορη. Προσοχή στην αύξηση της σχετικής υγρασίας.
- Διπλασιάστε τη δόση CANNAZYM σε 50 ml/10 λίτρα αν το υπόστρωμα έχει επαναχρησιμοποιηθεί.
- Κατά κανόνα, 20 ml/10 λίτρα. Αυξήστε έως το πολύ 40 ml/10 λίτρα για πιο έντονη ανθοφορία.

EC: Η τιμή της EC μετρείται σε mS/cm, όπου EC νερού = 0.0 στους 25°C, και σε pH 6.0.
Προσθέστε την EC του νερού που χρησιμοποιείτε στη συνιστώμενη EC!
Η συνολική EC στο παράδειγμα υπολογίστηκε με EC νερού 0.4.

pH: Το συνιστώμενο pH κυμαίνεται μεταξύ 5,2 και 6,2.
Η προσθήκη pH- μπορεί να αυξήσει την EC.
Προσθέστε pH- grow στη βλαστική φάση για μείωση του pH.
Προσθέστε pH- bloom στην αναπαραγωγική φάση για μείωση του pH.

Οι οδηγίες του πίνακα δεν χρειάζεται να τηρηθούν αυστηρά, αλλά μπορούν να βοηθήσουν τους αρχάριους καλλιεργητές να αναπτύξουν συστηματική στρατηγική. Η βέλτιστη τακτική λίπανσης εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως: θερμοκρασία, υγρασία, είδος φυτού, όγκος ριζών, ποσοστό υγρασίας στο υπόστρωμα, στρατηγική ποιήματος κ.λπ.

Δημιουργήστε το προσωπικό σας πρόγραμμα καλλιέργειας στο www.canna-gr.com.

CANNA
The solution for growth and bloom